

SPIROMETRIA- JA PEF-TUTKIMUKSIIN SEKÄ KEUHKOPUTKIEN ALTISTUSKOKEISIIN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET

Ennen diagnostisia keuhkofunktio tutkimuksia pitäisi tutkittavan olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään mainittu aika, kun halutaan tutkia tilannetta ilman lääkevaikutusta.

Lääkeaine	Rajoitus ennen tutkimusta
Antihistamiinit (rajoitus vain ennen keuhkoputkien altistuskokeita)	5 vrk*
Antikolinergit	24 t
Efedriini	12 t
Glukokortikoidit	4 viikkoa
Leukotrieeniantagonistit	3 vrk
Natriumkromoglikaatti	12 t
Nedokromiili	48 t
Sympatomimeetit	
<i>Tavalliset</i>	12 t
<i>Pitkävaikutteiset</i>	48 t
Teofylliinit	3 vrk
Yhdistelmävalmisteet	
<i>Glukokortikoidi ja pitkävaikutteinen sympatomimeetti</i>	48 t tai 4 viikkoa*
Yskänlääkkeet	3 vrk

* = Jos halutaan tutkia tilannetta ilman kortikosteroidivaikutusta, aika 4 viikkoa.