

SPIROMETRIA- JA PEF-TUTKIMUKSIIN SEKÄ KEUHKOPUTKIEN ALTISTUSKOKEISIIN VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET (kauppanimet)

1. Ennen diagnostisia keuhkofunktio tutkimuksia tutkittavan pitäisi olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään taulukossa mainittu aika:

24 t	ANTIKOLINERGIT Atro dual Atrovent ja Atrovent comp Ipramol Ipratropiumbromid Ipraxa Poikkeus Spiriva	12 t	NATRIUMKROMOGLIKAATTI JA NEDOKROMIILI Lomudal Tilade
4 vrk		12 t	SYMPATOMIMEETIT Tavalliset Adrenalin Airomir Bricanyl Buventol Ventilastin Ventoline
12 t	FENYYLIPROPANOLIAMIINI Rinexin		
4 viikkoa	KORTIKOSTEROIDIT (Jos halutaan tutkia tilannetta jossa todennäköisesti ei ole steroidivaikutusta) Aerobec Alvesco Asmanex Beclomet Budenofalk Budesonid Dexametason Entocort Flixotide Hydrocortison Medrol Novopulmon Prednisolon Prednison Pulmicort Solomet	48 t	Pitkävaikutteiset Foradil Formoterol Oxis Serevent Onbrez
3 vrk	YSKÄNLÄÄKKEET Kaikki	7 vrk	TEOFYLLIINIT Aminocort Nuelin depot Retafyllin Theofol ja Theofol comp.
3 vrk	LEUKOTRIEENIANTAGONISTIT Accolate Astecon Montelukast Singulair	3 vrk	MUUT BRONKODILATOIVAT LÄÄKKEET Daxas
		5 vrk	YHDISTELMÄVALMISTEET (Pitkävaikutteinen sympatomimeetti ja kortikosteroidi. Jos halutaan tutkia sympatomimeettivastetta ai- karaja 48 t, mutta 4 viikkoa jos halutaan poissulkea myös steroidivaikutus)
		48 t tai 4 viikkoa	Innovair Seretide Symbicort

2. Ennen keuhkoputkien altistuskokeita (histamiini- ja metakoliinialtistus) pitäisi tutkittavan lisäksi olla ilman seuraavia antihistamiinilääkkeitä:

5 vrk	ANTIHIAMIINIT (Mahdollinen vaikutus vain keuhkoputkien altistuskokeisiin, mutta ei muihin keuhkofunktio tutkimuksiin)	5 vrk	Histanova Histec Kestine Levazyr Levocetirizin Lomfast Loratadin Nefoxef Postafen Rinomar Senirex Telfast Tuulix Xyzal Zyrtec
	Aerinaze Aerius Alzyr Atarax Benadryl Cetirizin Cirrus Clarityn Duact Fexofenadine Gardex Heinix		